

anginetten® Halstabletten

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient! Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wirkstoff: Cetylpyridiniumchlorid

Zusammensetzung:

1 Lutschtablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Cetylpyridiniumchlorid 1 H 2 O 0,33 mg

Sonstige Bestandteile:

Glucosesirup (Trockensubstanz), Saccharose, Honigaroma, Zitronenaroma, Menthol, Weinsäure, Farbstoffe E 104, E 124 und E 131.

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackung mit 24 Lutschtabletten.

Indikationsgruppe:

Mund- und Rachentherapeutikum

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Divapharma-Knufinke Arzneimittelwerk GmbH

Motzener Straße 41

12277 Berlin

Tel.: (0 30) 7 20 07-2 66

Fax: (0 30) 7 20 07-3 26

Anwendungsgebiete:

Zur Mund- und Rachendesinfektion bei Husten, Heiserkeit und anderen bakteriellen Infektionen des Mund- und Rachenraumes wie Stomatitis, Gingivitis, Tonsillitis, Pharyngitis (Mundschleimhaut-, Zahnfleisch-, Hals- und Rachenentzündungen). Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie anginetten® Halstabletten nicht anwenden?

Überempfindlichkeit gegen quaternäre Ammoniumbasen und Menthol.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Für Kleinkinder sind anginetten® Halstabletten nicht geeignet.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Zur Anwendung von anginetten® Halstabletten in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. anginetten® Halstabletten sollten deshalb in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von anginetten® Halstabletten bzw. wie beeinflussen anginetten® Halstabletten die Wirkung anderer Arzneimittel?

Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da anginetten® Halstabletten sonst nicht richtig wirken können!

Wie viel, wie oft und wie sollten Sie anginetten® Halstabletten anwenden?

Lassen Sie stündlich 1 Lutschtablette im Mund zergehen, Kinder alle 2 Stunden. In Zeiten grippaler Infekte lutschen Sie gegen Ansteckungsgefahr täglich mehrmals 1 Tablette.

Wie lange sollten Sie anginetten® Halstabletten anwenden?

Eine zeitliche Begrenzung der Anwendung besteht nicht. Bei allen unklaren oder lang anhaltenden Beschwerden sollte jedoch der Arzt befragt werden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig anginetten® Halstabletten angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Sollten Sie eine Einzeldosis vergessen haben, bitte nehmen Sie dann nicht die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Anwendung in der angegebenen Weise fort.

Hinweis für Diabetiker:

1 Lutschtablette entspricht 0,22 BE.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von anginetten® Halstabletten auftreten?

Allergie gegen Cetylpyridiniumsalze.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und der Durchdrückpackung aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: Februar 2001

anginetten® Halstabletten desinfizieren den Mund- und Rachenraum. Sie bekämpfen Bakterien, die zu Infektionen in diesem Bereich führen. In Zeiten erhöhter Ansteckungsgefahr sind anginetten® Halstabletten zu empfehlen. Die Kombination Zitrone-Honig-Geschmack hat sich als besonders angenehm und wohlschmeckend erwiesen.

Haben Sie noch Fragen?

Bitte wenden Sie sich an:

Knufinke Info-Service

Tel.: (0180) 1 55 55 56 (zum Ortstarif)

E-Mail: info@divapharma.de

Pflichttext:

anginetten® Halstabletten, Anwendungsgebiete: Zur Mund- und Rachendesinfektion bei Husten, Heiserkeit und anderen bakteriellen Infektionen des Mund- und Rachenraumes wie Stomatitis, Gingivitis, Tonsillitis, Pharyngitis (Mundschleimhaut-, Zahnfleisch-, Hals- und Rachenentzündungen). Traditionell angewendet zur Besserung des Befindens.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Klosterfrau • Klosterfrau Homöopathie • Klosterfrau Mobilind • Klosterfrau Broncholind® • Klosterfrau Nervenruh • Klosterfrau Gastrolind® • Gastrobin® • taxofit® • Tiger Balm® • neo-angin® • Maaloxan® / Maalox® • Soledum® • nasic® • nasic®-cur • Bronchicum® • anginetten® • Ricola® • Krügerol® • Vita-Gerin®-Geistlich N • regazell energen plus • Contramutan® • Limptar® • Cholagogum Nattermann® • Ameu • Bedan • Hepar SL • Jarsin • Kwai • Kwai Vitabetics • Kaveri • Faros • Sedonium • Euminz • Enelbin® • Carnigen® • Essaven® • Lipostabil® • Melrosum® • Monapax® • Traumanase® • Maria Galland • yul® • Goldsam • condomi® • Assugrin • Thüringer • Migränin • Mono Migränin • Balneum Aqeo • Balneum Hermal • Balneum Intensiv • Balneum Junior • Balneum Lutsine • Dobendan • Nurofen • Clearasil •

© 2006 Klosterfrau Vertriebs GmbH