

# KOHLE-PULVIS

Wirkstoff: Medizinische Kohle

## Zusammensetzung

10 g Pulver enthalten:

### Arzneilich wirksamer Bestandteil:

10 g Medizinische Kohle

### Sonstige Bestandteile:

Keine.

## Darreichungsform und Inhalt

Pulver zur Herstellung einer oralen Suspension,  
Dosen zu 10 g

## Stoff- u. Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Antidiarrhoikum, Antidot bei Vergiftungen

## Pharmazeutischer Unternehmer

Köhler Pharma GmbH

Neue Bergstraße 3-7, 64665 Alsbach-Hähnlein

Telefon: 0 62 57 / 6 10 31, Telefax: 0 62 57 / 77 90

## Anwendungsgebiete

Zur symptomatischen Behandlung des Durchfalls bei Erwachsenen; bei Säuglingen und Kindern nur nach ärztlicher Anweisung. Zur Verhinderung der Aufnahme in den Körper bei akuten oralen Vergiftungen und bei Überdosierung von Arzneimitteln. Zur Beschleunigung der Ausscheidung bei Vergiftungen mit Stoffen, die vom Darm in die Leber übergehen können (z.B. Carbamazepin, Phenobarbital, Phenylbutazon, Theophyllin).

## Gegenanzeigen

Fieberhafter Durchfall. Bei Vergiftungen mit ätzenden Stoffen (starke Säuren und Laugen) sollte medizinische Kohle nicht eingenommen werden, da hierdurch diagnostische Maßnahmen, wie Ösophagoskopie und Gastroskopie erschwert werden.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Keine.

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Die Wirkung oral eingenommener Medikamente wird im allgemeinen durch die Anwendung von KOHLE-PULVIS verringert. Der Gebrauch von KOHLE-PULVIS kann die Zuverlässigkeit von oralen Kontrazeptiva/Ovulationshemmern reduzieren, wodurch eine zusätzliche Methode der Empfängnisverhütung nach dem Gebrauch von KOHLE-PULVIS notwendig ist.

## Warnhinweise

Medizinische Kohle wirkt nicht bei Vergiftungen mit folgenden Substanzen: Lithium, Thallium, Eisensalze, Blausäure, Borsäure, Methanol, Ethanol, Ethylenglykol. Hier sind andere Maßnahmen zur Giftentfernung (z. B. provoziertes Erbrechen, Magenspülung) angezeigt. Medizinische Kohle ist nicht wirksam bei Verätzungen mit Säuren oder Laugen und kann eine nachfolgende endoskopische Diagnostik erschweren.

## **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

### *Dosierungsempfehlung bei Durchfällen:*

Zur unterstützenden Therapie bei Durchfall erhalten Erwachsene mehrmals täglich 10 g KOHLE-PULVIS.

KOHLE-PULVIS ist als Aufschlämmung mit Wasser im Verhältnis 1:10 nach Aufrühren anwendungsbereit.

Bei Säuglingen und Kindern soll KOHLE-PULVIS grundsätzlich nur im Rahmen einer ärztlichen Behandlung angewendet werden.

### *Dosierungsempfehlung bei Vergiftungen:*

Je nach aufgenommener Giftmenge sind 50 bis 100 g KOHLE-PULVIS mit ca. 400 ml Wasser oder ungesüßtem Tee aufzurühren und oral oder mit Magenschlauch zu verabreichen. Bei Kindern wird die Gabe von 1 g/kg Körpergewicht (max. 50 g) empfohlen. Bei schweren Vergiftungen und zur Unterbrechung der Aufnahme von Stoffen, die vom Darm in die Leber übergehen können, ist eine wiederholte Verabreichung von KOHLE-PULVIS in Abständen von 2 bis 4 Stunden angezeigt. Im allgemeinen sind im Anschluß an die Kohlegabe Abführmaßnahmen durchzuführen.

## **Nebenwirkungen**

Nach Gabe sehr hoher Dosen kann es zu Verstopfung kommen.

## **Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.**

Keine.

## **Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit**

Keine Einschränkungen

## **Stand der Information**

Januar 2001

**Nach Ablauf des Verfalldatums soll das Arzneimittel nicht mehr angewendet werden.**

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

**Das Präparat ist trocken und gut verschlossen aufzubewahren.**

### **Hinweis zur Anwendung**

Dose vorsichtig öffnen und mit 70-80 ml Wasser oder ungesüßtem Tee (entsprechend ca. halber Doseninhalt) auffüllen.

Danach den Doseninhalt mit einem Tee- oder Kaffeelöffel aufrühren. Nach dem vollständigen Suspendieren der Medizinalkohle bitte zügig austrinken, da sich sonst das Pulver wieder absetzen kann.

Alternativ kann die Kohle nach Verschuß mit dem Deckel durch kreisende Schwenkbewegungen suspendiert werden. Bitte nicht schütteln! Anschließend ist der Schraubverschluß vorsichtig zu öffnen: durch Verdrängung der absorbierten Luft durch das Wasser kann es sonst beim Öffnen der Dose zu Versprühen des Inhaltes kommen!

## **Packungsgrößen**

KOHLE-PULVIS (Carbo medicinalis) als Pulver.

Packungen mit 1 x 10 g (N1) 4 x 10 g (N2)  
10 x 10 g (AP)